

くすりのしおり

注射剤

2013年12月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g

主成分：タルク (Talc)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

胸膜癒着作用により胸水の貯留スペースを消失させ、悪性胸水の再貯留を抑制することで、悪性胸水にともなう呼吸困難および疼痛（胸痛）を改善します。

通常、悪性胸水の再貯留抑制に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肺機能障害または心機能障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は<<

>>医療担当者記入

・通常、胸膜腔内に注入します。

通常、注入回数は1回です。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発熱、便秘、倦怠感、頭痛、胸部不快感、胸痛、皮膚感染、食欲減退、癌疼痛、呼吸困難などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・息が苦しい、咳や痰が出る、呼吸がはやくなる、脈がはやくなるなど [急性呼吸窮迫症候群]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。